

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

EP 1 186 669 A1

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
13.03.2002 Patentblatt 2002/11

(51) Int Cl.7: C12Q 1/68

(21) Anmeldenummer: 00119182.4

(22) Anmeldetag: 05.09.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: BioChip Technologies GmbH  
79108 Freiburg i. Br. (DE)

(72) Erfinder:  
• Zeltz, Patric  
79199 Kirchzarten (DE)

• Schneider, Stephan  
79102 Freiburg (DE)


(74) Vertreter: Stürken, Joachim  
Joachim Stürken  
Patentanwalts-gesellschaft mbH  
Engesserstrasse 4 a  
79108 Freiburg i. Br. (DE)

(54) Verfahren zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation

(57) Die Erfindung betrifft ein allgemeines Verfahren zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation durch verschachtelte Polymerasekettenreaktion in einem kombinierten Flüssig-

phasen/Festphasen-DNA-Microarray-system, sowie davon abgeleitete Modifikationen zur Bestimmung von z.B. Punktmutationen und zum Sequenzieren von DNA-Teilbereichen, welche nach einer besonderen Ausführungsform auch unbekannt sein können.

Abb.1



EP 1 186 669 A1

## Beschreibung

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft ein allgemeines Verfahren zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation durch verschachtelte Polymerasekettenreaktion (im folgenden auch PCR = engl. "Polymerase Chain Reaction") in einem kombinierten Flüssigphasen/Festphasen-DNA-Microarraysystem (ein solches Festphasen-Microarraysystem wird unabhängig vom konkret daran immobilisierten Biomolekül (hier DNA) allgemein auch als "Biochip" bezeichnet). Ausgehend von diesem allgemeinen Verfahren, das als solches bereits den Nachweis bestimmter Analyten in einer zu analysierenden Probe gewährleistet, betrifft die vorliegende Erfindung gleichermaßen davon abgeleitete Verfahren zur Bestimmung von Punktmutationen und allelischen Varianten sowie Verfahren zur Bestimmung der Sequenz von DNA-Teilbereichen, und zwar auch von unbekannten DNA-Teilbereichen.

**[0002]** Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung wird der Begriff "parallel" kontextabhängig mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Zum einen ist z.B. die unten erwähnte parallele Bestimmung der einzelnen Sequenzbausteine durch Verwendung unterschiedlicher Primer möglich, d.h. der Multiplexbetrieb, zum anderen bedeutet "parallele" Amplifikation unter konkreter Bezugnahme auf ein erfindungsgemäßes Verfahren die gleichzeitige Amplifikation von Nucleinsäuren sowohl in der flüssigen als auch an der festen Phase mittels erfindungsgemäß bezeichneter  $P_3$ -Primer.

**[0003]** Im folgenden werden die Begriffe Sonde, PCR-Primer bzw. Primer je nach der Funktion des betreffenden Oligonucleotids verwendet. Ein Oligonucleotid, das als Primer zur spezifischen Amplifikation von Zielsequenzen verwendet werden kann, kann auch als Sonde zum Nachweis der Zielsequenz verwendet werden.

**[0004]** Ein Festphasen-Microarraysystem und ein Verfahren zur Analyse von markierten DNA-Sequenzen durch Hybridisierung an auf einem festen Träger immobilisierte Sonden und durch Bestimmung der Lokalisierung der Markierung auf der Oberfläche ist beispielsweise aus EP 0 373 203 bekannt.

**[0005]** Für eine solche DNA-Microarray-Analyse sind eine Reihe von Einzelschritten nötig. So muß die Proben-Nucleinsäure direkt oder in Form einer Kopie markiert werden, oder aber es wird mit einer Fänger-Nucleinsäure auf dem Mikroarray und einer zweiten Detektionssonde in Lösung gearbeitet. Dabei ist für viele Anwendungen, wie z.B. den Nachweis von biologischen Kontaminationen, die Amplifikation der Probensequenz durch z.B. eine PCR nötig. Die (markierte) Probe wird dann mit der auf dem Mikroarray gebundenen Sonde hybridisiert, um ein spezifisches, ortsgebundenes Signal zu erzeugen, welches z.B. über eine Detektionssonde aufgenommen und weitergeleitet werden kann.

Durch diese Vorgehensweise fallen viele Einzelreaktionsschritte an, die diese Analysen arbeits-, kostenintensiv, langsam und darüber hinaus fehleranfällig machen.

**[0006]** Die Durchführung einer PCR in Anwesenheit eines festen Trägers bzw. Chip ("PCR on Chip") ist an sich bereits bekannt (Shoffner M. A., Cheng J., Hvichia G. E., Kricka U., Wilding P.: Chip PCR. I. Surface passivation of microfabricated silicon-glass chips for PCR. *Nucleic Acids Res.* 1996 Jan 15; 24(2):375-9.; Cheng J., Shoffner M. A., Hvichia G. E., Kricka U., Wilding P.: Chip PCR. II. Investigation of different PCR amplification systems in microfabricated silicon-glass chips. *Nucleic Acids Res.* 1996 Jan 15; 24(2):380-5.

**[0007]** Auch das Prinzip der sog. verschachtelten PCR (engl. "nested PCR") ist bekannt (vgl. z.B. C. R. Newton, A. Graham: "PCR", Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin Oxford 1994, S. 59 und die dort angegebenen weiteren Literaturstellen). Bei der verschachtelten PCR werden zwei PCR-Primer-Paare verwendet, von denen die Mitglieder eines Paares (die sog. äußeren PCR-Primer) stromaufwärts bzw. stromabwärts der zu amplifizierenden Ziel-DNA-Sequenz hybridisieren. Die Mitglieder des zweiten Primer-Paares (die sog. inneren PCR-Primer) hybridisieren innerhalb des Abschnitts, der vom Design des ersten Primer-Paares vorgegeben wird. Der Vorteil dieser Technik besteht in der erheblichen Erhöhung der Empfindlichkeit und der Spezifität, da bevorzugt die Ziel-DNA-Sequenz amplifiziert wird. Diese Technik ist aber außerordentlich empfindlich gegenüber Verunreinigungen, wie sie beispielsweise auch durch das Zusammenpipettieren der für die PCR erforderlichen Reagenzien eingeschleppt werden können.

**[0008]** Außerdem muß bei einer verschachtelten PCR entweder das erste Amplikon verdünnt oder mindestens einer der äußeren Primer entfernt werden. Wenn alle drei Primer gleichzeitig in dem Ansatz vorliegen, ergibt sich keine Erhöhung der Empfindlichkeit und der Spezifität mehr. Ein Hinzupipettieren ist nach der ersten Amplifikation im Prinzip zwar möglich, jedoch mit dem Risiko verbunden, daß die der "nested PCR" normalerweise innewohnenden Vorteile (s.o.) nicht realisiert werden können.

**[0009]** Im allgemeinen wird die Verdünnungsmethode angewendet, bei der die Konzentration der ursprünglichen Matrize und die Konzentration mindestens eines der äußeren Primer (nachfolgend mit  $P_1$  bzw.  $P_2$  bezeichnet) stark vermindert wird.

**[0010]** Es ist ferner versucht worden, die PCR-Reagenzien vorzumischen und entsprechend zu stabilisieren, insbesondere um die Durchführung der PCR-Reaktion zu vereinfachen. Im Stand der Technik ist jedoch nicht beschrieben, dass die Reaktionsteilnehmer der vorgesehenen Umsetzung direkt auf einer Microarrayanordnung in dehydratisierter Form bereitgestellt werden, so daß die Reaktion nur noch durch Zugabe der vorzugsweise wäßrigen Probenlösung gestartet werden kann.

[0011] Im Stand der Technik sind unterschiedliche Techniken zur Lyophilisierung bzw. Trocknung von Reagenzien für die Durchführung von Nucleinsäure-Analysen beschrieben. So wird im US-Patent 5 565 318 die Herstellung von Semisphären mit allen für eine Reaktion nötigen Komponenten, darunter auch Nucleinsäuren, beschrieben. Ähnliche Techniken werden in den Anmeldungen FR 2 674 253, EP 0 298 669, EP 0 726 310, GB 2 333 358, WO 94/17106, WO 98/00530, US 5 250 429 und EP 0 383 569 angewendet.

[0012] In der Patentanmeldung WO 96/32497 werden konkret alle wichtigen Nucleinsäure-Techniken in Bezug auf die Verwendung solcher Reagenziensphären beschrieben. In der Patentanmeldung WO 94/16107 ist zusätzlich noch ein Apparat bzw. eine Vorrichtung erwähnt, bei dem die getrockneten Reagenzien zu einer Sequenzierungsreaktion auf einer Platte (vermutlich einer Microtiterplatte) verwendet werden. In der Patentanmeldung WO 96/17083 wird ein fester Träger in Form eines Kammes beschrieben, auf dem sich diese Reagenzien befinden und der auf sog. 8-ter Strips bzw. Microtiterplatten gegeben werden kann, so daß nach der Ablösung der Reagenzien die Reaktion in den Vertiefungen der Microtiterplatten ablaufen kann.

[0013] In der Patentanmeldung WO 93/14223 wird die Aufbringung der einzelnen PCR-Reagenzien in Form von räumlich voneinander getrennten Flecken ("Spots") bzw. auch eine flächige Aufbringung an eine feste Phase in Form eines Objektträgers offenbart. Ferner wird die reversible Bindung getrockneter Markierungssubstanzen und die Markierung einer Sonde nach der Rehydrierung beschrieben. Die Sonde bzw. Sonden-Nucleinsäure selbst liegt hierbei aber ausdrücklich reversibel an den festen Träger gebunden vor.

[0014] Keine dieser im Stand der Technik beschriebenen Techniken ermöglicht die parallele Amplifikation in einem gekoppelten Flüssig-/Festphasen-PCR-System, bei dem die gewünschten Ergebnisse durch Auswertung eines direkt an der festen Phase des Systems nachweisbar gebildeten und damit kovalent gebundenen Extensionsprodukts hoch-spezifisch, mit hohem Durchsatz und reproduzierbar - gewünschtenfalls auch in Echtzeit - generiert und den unterschiedlichen Anwendungsgebieten zugeführt werden können.

[0015] Aufgabe der Erfindung ist, die dem Stand der Technik anhaftenden Mängel zu beseitigen und ein einfaches und fehlerfrei zu handhabendes und preisgünstiges Verfahren zur Amplifikation und Analyse von DNA-Sequenzen bereitzustellen, ohne das Kompromisse hinsichtlich der Empfindlichkeit und Spezifität zu machen sind.

[0016] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch ein allgemein anwendbares Verfahren zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation in einem kombinierten Flüssigphasen/Festphasen-DNA-Microarraysystem, indem man eine verschachtelte Polymerasekettenreaktion unter Verwendung von x PCR-Primersätzen aus jeweils min-

destens 3 PCR-Primern  $P_{11}$ ,  $P_{21}$ ,  $P_{31}$ ,  $P_{12}$ ,  $P_{22}$ ,  $P_{32}$ ,  $P_{13}$ ,  $P_{23}$ ,  $P_{33}$ , ...  $P_{1x}$ ,  $P_{2x}$ ,  $P_{3x}$  durchführt, wobei x eine natürliche Zahl bedeutet und der Anzahl der zu bestimmenden DNA-Sequenzen entspricht, und wobei für jeden der x PCR-Primersätze

(a) zwei äußere PCR-Primer  $P_1$ ,  $P_2$  so ausgewählt werden, daß sie an stromaufwärts und stromabwärts der zu amplifizierenden Ziel-DNA-Sequenz liegende DNA-Teilsequenzen hybridisieren,

(b) ein innerer PCR-Primer  $P_3$  so ausgewählt wird, daß er an eine innerhalb der zu bestimmenden Ziel-DNA-Sequenz liegende DNA-Teilsequenz hybridisiert und in der Lage ist, ein  $P_3$ -Extensionsprodukt zu bilden, und

(c) die x äußeren PCR-Primer  $P_{11}$ ,  $P_{21}$ ,  $P_{12}$ ,  $P_{22}$ ,  $P_{13}$ ,  $P_{23}$ , ...  $P_{1x}$ ,  $P_{2x}$  in der flüssigen Phase gegenüber den x inneren PCR-Primern  $P_{31}$ ,  $P_{32}$ ,  $P_{33}$ , ...  $P_{3x}$  im Überschuß vorliegen, und

(d) die x inneren PCR-Primer  $P_{31}$ ,  $P_{32}$ ,  $P_{33}$ , ...  $P_{3x}$  an x räumlich beabstandeten definierten Positionen unter Bildung eines DNA-Microarrays irreversibel an eine Festphase gebunden vorliegen, und

(e) man die Bestimmung durch Ermittlung des Vorhandenseins eines  $P_3$ -Extensionsproduktes an der definierten Position des DNA-Microarrays durchführt.

[0017] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich u.a. die nachfolgend dargelegten Vorteile erzielen. Die verschachtelten PCR-Reaktionen laufen direkt und parallel auf dem Festphasen-DNA-Mikroarray ab. Das bei der Durchführung einer konventionellen verschachtelten PCR in flüssiger Phase üblicherweise erforderliche Verdünnen und Neueinstellen des Reaktionsansatzes nach der ersten PCR unter Verwendung der äußeren Primer  $P_1$  und  $P_2$  entfallen. Für den Anwender des vorliegend beschriebenen Verfahrens fällt zur Durchführung der gesamten Analyse nur noch ein Arbeitsschritt an, d.h. er muß nur noch die Proben-Nucleinsäuren und die PCR-Reagenzien (DNA-Polymerase und Desoxynucleosidtriphosphate in PCR-Puffer) zupipetieren, sofern diese Reagenzien vollständig oder zum Teil nicht bereits nach einer bevorzugten Ausführungsform in dehydratisierter Form auf dem festen Träger bereitgestellt werden. Dadurch sinken sowohl der Arbeitsaufwand als auch die Kontaminationsgefahr signifikant bei deutlicher Reduktion der Fehlermöglichkeiten.

[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation durch verschachtelte PCR in einem kombinierten Flüssigphasen/Festphasen-DNA-Microarraysystem besitzt die gleiche Empfindlichkeit wie eine konventionelle, d.h. in flüssiger Phase durchgeführte,

PCR und gleichzeitig eine höhere Spezifität als Hybridisierungsassays und Primer-Extensionassays. Der Grund dafür ist, daß die dem System Primer/Proben-DNA/Polymerase eigene Spezifität in bezug auf die Amplifikation zusätzlich noch durch die spezifische Wechselwirkung zwischen dem an den festen Träger immobilisierten inneren PCR-Primer (der somit auch die Funktion einer Sonde hat) und dem Amplikon deutlich erhöht wird. Insgesamt resultiert so eine Spezifität, die z.B. derjenigen eines 5'-Exonuklease-Assays (z.B. unter Verwendung von TaqMan™-Polymerase) überlegen ist.

**[0019]** Diese Vorteile lassen sich mit einem einfachen Festphasenprimer-Extensionassay, wie z.B. der Mikro-titerplatten-Festphasen-PCR (Nunc, vgl. z.B. Nucleo-Link™) oder der "Bridge™-PCR" (Mosaic Technologies, vgl. z.B. WO/36094), nicht erzielen.

**[0020]** Durch die ortsgebundenen inneren PCR-Primer, die auch als Sonden fungieren, kann nach einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens der Erfindung auf dem Mikroarray mit einem Markierungsreagenz (beispielsweise unter Verwendung markierter Nucleotide) gearbeitet werden, um parallel viele unterschiedliche Sequenzen, Merkmale oder Eigenschaften zu untersuchen.

**[0021]** Eine markierungsfreie Detektion, beispielsweise mit optischen oder anderen physikalischen Methoden ist aber ebenfalls möglich, d.h. das erfindungsgemäße Verfahren kann auch ohne markierte Nucleotide durchgeführt und die Reaktionsprodukte gemessen werden.

**[0022]** Hier zeigt das erfindungsgemäße Verfahren gegenüber den konventionellen Hybridisierungsverfahren des Standes der Technik, bei denen unspezifische Massezuwächse an der Oberfläche des festen Trägers ein Problem darstellen, den Vorteil, daß der unspezifische Massezuwachs an der Oberfläche durch Anwendung hoher Temperaturen stark vermindert wird, wobei die kovalente Bindung der spezifischen Extensionsprodukte an den Festphasenprimer  $P_3$  für eine nahezu ausschliessliche Bestimmung der gewünschten Spezifität sorgt.

**[0023]** Die Messung eines ortsspezifischen Massezuwachses kann z.B. durch physikalische Methoden erfolgen. Beispielsweise kann die ortsspezifische Änderung des Brechungsindex, die ortsspezifische Änderung des elektrischen Widerstandes bzw. der elektrischen Leitfähigkeit, die ortsspezifische Änderung der optischen Dichte oder auch ortsspezifische dichroische Effekte, etc. gemessen werden.

**[0024]** Grundsätzlich ist das allgemeine erfindungsgemäße Verfahren für ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten geeignet, wobei zwischen reinem diagnostischen Nachweis bestimmter Analyten in einer zu analysierenden Probe einerseits und komplexer abgeleiteten Modifikationen des Verfahrens zur Ermittlung von Sequenzdaten oder Informationen über funktionelle Zusammenhänge im Rahmen entsprechender Geno-

mik- bzw. Proteomik-Fragestellungen unterschieden werden kann. Diese Unterscheidung dient jedoch nur der Veranschaulichung und soll die grundsätzlich offene Anwendbarkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens in keiner Weise beschränken.

**[0025]** Nach einer besonderen Ausführungsform umfasst das allgemeine Verfahren der vorliegenden Erfindung daher ein davon abgeleitetes Verfahren insbesondere zur Bestimmung von Punktmutationen mittels paralleler Amplifikation, bei dem man

(a) unter Anwendung des oben definierten erfindungsgemäßen Verfahrens eine Polymerasekettenreaktion durchführt, durch welche sämtliche x zu bestimmenden Varianten amplifiziert werden, wobei

(b) mindestens  $P_3x$  Primerfamilien verwendet werden, wobei sich jedes einzelne Mitglied  $P_3x-N$  der Primerfamilie hinsichtlich des Nukleotids an seinem 3'-Ende von jedem anderen Mitglied unterscheidet, wobei N die unterschiedlichen Nukleotide A, C, G und T bezeichnet, und die Annealingtemperatur der Amplifikationsreaktion so ausgewählt wird, daß die gewünschten Extensionsprodukte nur an denjenigen definierten Positionen des DNA-Microarrays gebildet werden, welche durch die Anwesenheit des zu der zu bestimmenden Punktmutation im wesentlichen exakt komplementären Primers gekennzeichnet sind,

(c) zur Amplifikation eine DNA-Polymerase ohne 3'→5'-Exonuklease-Aktivität verwendet wird, und

(d) die Bestimmung der Punktmutation gemäß Schritt (e) des oben definierten erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt.

**[0026]** Die Angabe "im wesentlichen exakt komplementärer Primer" bedeutet hier, daß hybridisierte und von der DNA-Polymerase als Matrize (engl. "Template") akzeptierte Primer verlängert werden, d.h. in der Regel sind im Bereich des 3'-Endes sämtliche Nukleotide komplementär zur Matrize.

**[0027]** Ferner umfasst das allgemeine Verfahren der vorliegenden Erfindung ein davon abgeleitetes Verfahren zur Bestimmung der Sequenz von DNA-Teilbereichen mittels paralleler Amplifikation, bei dem

(a) unter Anwendung des oben definierten erfindungsgemäßen Verfahrens eine Polymerasekettenreaktion durchgeführt wird, durch welche sämtliche x zu bestimmenden Sequenzen amplifiziert werden, wobei

(b) mindestens  $P_3x$  Primerfamilien verwendet werden, wobei sich jedes einzelne Mitglied  $P_3x-N$ , ...  $P_3x-Nn$  der Primerfamilie hinsichtlich seiner 1 bis n

Nukleotide am 3'-Ende von jedem anderen Mitglied unterscheidet, wobei N die unterschiedlichen Nukleotide A, C, G und T bezeichnet, und n die Länge der zu bestimmenden Sequenz(en) angibt, und die Annealingtemperatur der Amplifikationsreaktion so ausgewählt wird, daß die gewünschten Extensionsprodukte nur an denjenigen definierten Positionen des DNA-Microarrays gebildet werden, welche durch die Anwesenheit des zu der zu bestimmenden Sequenz im wesentlichen exakt komplementären Primers gekennzeichnet sind,

(c) zur Amplifikation eine DNA-Polymerase ohne 3'→5'-Exonuclease-Aktivität verwendet wird, und

(d) die Ermittlung der zu bestimmenden Sequenz (en) gemäß Schritt (e) des oben definierten allgemeinen erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt.

**[0028]** Obwohl sich die Anwendungsbereiche der ersten beiden abgeleiteten Modifikationen des allgemeinen erfinderischen Verfahrens durchaus unterscheiden können, erfolgt die Ermittlung im wesentlichen gleich. Zwar soll im abgeleiteten Verfahren zur Bestimmung der Sequenz von DNA-Teilbereichen mehr als nur das endständige 3'-Nukleotid bestimmt werden, aber durch das bekannte Design des Mikroarrays und die Gruppierung der einzelnen Reaktionsbereiche in Felder, die mit der ersten, zweiten, dritten ... bzw. n-ten Position der zu bestimmenden Sequenz korrespondieren, erfolgt die Bestimmung des DNA-Teilbereichs durch sukzessives Ablesen der für jedes Feld erhaltenen Daten. Mit anderen Worten wird zuerst das Feld ausgewertet, in welchem ausgehend vom Design des Arrays die erste zu bestimmende Base ermittelt wird, bevor in Kenntnis des Ergebnisses aus diesem ersten Feld die Bestimmung der Base an der zweiten Position der zu ermittelnden Sequenz vorgenommen wird, u.s.w. Die jeweilige Untersuchung eines Feldes erfolgt vorzugsweise durch Erfassung und Zuordnung der größten gemessenen Signalstärke. Selbstverständlich können die Feldmessungen auch parallelisiert ablaufen. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auf Abb. 3 verwiesen.

**[0029]** Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das allgemeine Verfahren ferner ein Verfahren zur Bestimmung der Sequenz von unbekannten DNA-Teilbereichen mittels paralleler Amplifikation, bei dem

(a) unter Anwendung des oben definierten allgemeinen erfindungsgemäßen Verfahrens eine Polymerasekettenreaktion durchgeführt wird, durch welche die Abfolge sämtlicher n Nukleotide der zu bestimmenden Sequenzen ermittelt wird, wobei

(b) ein sämtliche Permutationen umfassender Satz von inneren Primern  $P_3$  mit einer bestimmten Länge n verwendet wird, wobei mehrere Primer mit einer

jeweils unterschiedlichen Region der zu bestimmenden Sequenz exakt hybridisieren und Extensionsprodukte definierter Länge bilden können, und sich jeder einzelne dieser Primer an einer anderen definierten Position des DNA-Microarrays befindet,

(c) zur Amplifikation eine DNA-Polymerase ohne 3'→5'-Exonuclease-Aktivität verwendet wird, und

(d) die Bestimmung der Sequenz durch Ermittlung der in Schritt (b) gebildeten Extensionsprodukte, Zuordnung dieser ermittelten Werte zu den definierten Positionen des DNA-Microarrays, und Zusammenstellung der zu bestimmenden Sequenz im Rahmen einer ggf. Computer-unterstützten Kombinatorik erfolgt, wobei die tatsächliche Aneinanderreihung der Einzeldaten zur Gesamtsequenz unter Nutzung der jeweils überlappenden Sequenzbereiche vorgenommen wird.

**[0030]** Alternativ kann eine Konsensus-PCR auch durch das Anligieren von PCR-Adaptoren erfolgen. Damit wird eine Signatur-Sequenzierung ausgehend von einem "Pool" an cDNA Sequenzen erreicht (auch quantitativ ausführbar im Falle einer Online-Beobachtung der Amplifikation). Ein solches Sequenzierungsverfahren (MPSS = engl. "Massively Parallel Signature Sequencing") wurde kürzlich beschrieben (Brenner et al., Nature Biotechnology Vol. 18 June 2000, Seiten 630-34) und kann unter Berücksichtigung der vorliegend offenbarten technischen Lehre auf sehr viel einfachere Weise durchgeführt werden. Das erfindungsgemäße Verfahren erfordert hierzu lediglich die cDNA-Generierung, einen Restriktionsverdau und die Adaptorligation vor dem Assay. MPSS erfordert im Gegensatz dazu die cDNA-Herstellung, einen Restriktionsverdau, die anschließende Hybridisierung an "Beads", die "FACS"-Sortierung (FACS = engl. Fluorescence-activated Cell Sorter) der "Beads" und eine Wiederholung der Ligation sowie Restriktionsverdauschritte.

**[0031]** Dem Fachmann sind die grundsätzlichen Schritte der Sequenzermittlungen aus der allgemeinen Literatur zur "Sequencing by Hybridization"-Technologie bekannt (vgl. z.B. EP 0 373 203).

**[0032]** Im übrigen wird zur Veranschaulichung des geschilderten Verfahrens auf die Abbildungen 4 und 5 verwiesen.

**[0033]** Nach einer alternativen Ausführungsform dieses Verfahrens erfolgt die Bestimmung der Sequenz durch Ermittlung der jeweiligen Längen der in Schritt (b) gebildeten Extensionsprodukte und Zuordnung der ermittelten Werte zu den definierten Positionen des DNA-Microarrays.

**[0034]** Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann das zuvor beschriebene Verfahren auch zur Signatur-Sequenzierung und Quantifizierung ausgehend von einer unbekannten Sequenz mittels Primern erfolgen, welche mindestens 9 Nukleotide aufwei-

sen.

[0035] Unbekannte Sequenzen werden hierzu mit einem Restriktionsenzym geschnitten, Adaptorprimer anligiert und die Ligationsprodukte von der restlichen DNA separiert und z.B. mittels Nonamerprimern auf und an dem Chip amplifiziert. Zum Beispiel werden die cDNAs eines kompletten bakteriellen RNA-"Pools" bestimmt. Das Amplikon umfaßt vorzugsweise 18-25 bp. Die Festphasenprimer sind alle 9 Nucleotide lang und unterscheiden sich in ihrer Sequenz. Es sind 262144 unterschiedliche Primervarianten auf der Festphase. Wiederum werden Standard-PCR-Bedingungen angewandt, aber die Annealingtemperatur wird nach 10-20 Zyklen auf 30-50°C erniedrigt, um die Festphasen-Amplifikation mit den Nonameren zu begünstigen. Nur exakt komplementäre Primer werden verlängert. Das entstandene Muster nach Anfärbung erlaubt durch Abgleich mit üblichen Datenbanken die Sequenzbestimmung.

[0036] Somit wird die Sequenzermittlung von Produkten des "SAGE"-Verfahrens ermöglicht (Velculescu V. E. et al., Science 1995, Vol. 270, Seiten 484-87; Neilson, L. et al., Genomics 2000, Vol 63, Seiten 13-24) Durch Online-Detektion kann die Ausgangsmenge der cDNAs bestimmt werden.

[0037] Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung einen Festphasen-DNA-Microarray zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens, auf dem an n räumlich beabstandeten Positionen x innere PCR-Primer  $P_1, P_2, P_3, \dots, P_x$  irreversibel an die Festphase gebunden sind.

[0038] Durch das erfindungsgemäße Verfahren zur Bestimmung der Sequenz von DNA-Teilbereichen mittels paralleler Amplifikation lassen sich die Nachteile der Sequenzierungsverfahren des Standes der Technik beheben, nämlich unter anderem die durch die grundsätzliche Linearität einer solchen Methodik vermittelte geringe Empfindlichkeit.

[0039] Beispielsweise findet beim sog. "Cycle Sequencing" nur eine Amplifikation in der flüssigen Phase statt, so daß die Trennung der Sequenzierungsprodukte nötig ist, was Fehlermöglichkeiten beinhaltet und arbeitsaufwendig ist.

[0040] Beim sog. "Mini Sequencing" (nach der Sanger'schen Dideoxy-Sequenzieretechnik) muß dagegen die Matrice bzw. das "Template" in großer Menge verwendet werden, da nur Dideoxynucleotide (ddNTPs) verwendet werden, so daß lediglich eine lineare Amplifikation stattfindet.

[0041] Beide beispielhaft beschriebenen Sequenzierungstechniken weisen gegenüber dem erfindungsgemäßen Verfahren den Nachteil auf, dass eine gleichzeitige, d.h. parallele Amplifikation der zu bestimmenden Matrice nicht möglich ist.

[0042] Das erfindungsgemäße Verfahren ist im übrigen dadurch von den bekannten Verfahren wie insbesondere der "Sequencing-by-Hybridisation"-Technik (wie z.B. in EP 0 373 203 beschrieben) abgegrenzt, daß nicht ein gesamtes Amplikon, sondern gezielt nur rele-

vante Bereiche davon sequenziert werden können. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren eine gleichzeitige Bestimmung der Sequenz mehrerer interner Regionen des Amplikons.

[0043] Zur SNP-Ermittlung (engl. "Single Nucleotide Polymorphism") durch Hybridisierung oder unter Anwendung der ARMS-Technik (engl. "Amplification Refractory Mutation System", vgl. z.B. P. Scheinert: Nachweis von Mutationen; BioTec Labortechnik, 5/6/1998) muß die betreffende Sequenz bekannt sein. Außerdem wird ein sog. "Fehl-Priming" nicht erkannt. Ein Multiplexbetrieb (parallele Durchführung unter Verwendung mehrerer verschiedener Primer) ist aufgrund der Generierung von Extensionsprodukten gleicher Länge nicht möglich, so daß getrennte Ansätze zwingend sind.

[0044] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bestimmung von Punktmutationen mittels paralleler Amplifikation hat demgegenüber insbesondere die nachfolgend dargestellten Vorteile.

[0045] Die Sequenzen der zu ermittelnden 3'-Basen müssen nicht (können aber) bekannt sein. Außerdem müssen keine terminierenden Agenzien verwendet werden (wie bei der Sanger'schen Dideoxy-Sequenzieretechnik), und es ist die parallele Bestimmung der einzelnen, verschiedene SNP differentiell charakterisierenden, Sequenzbausteine möglich, d.h. der Multiplexbetrieb.

[0046] Die Empfindlichkeit ist sehr hoch (1 Kopie wird erkannt), da mit minimalsten Matrizenmengen (1 Kopie reicht) mit Hilfe exponentieller Amplifikation sequenziert wird.

[0047] Weitere vorteilhafte und/oder bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0048] Im folgenden wird die Erfindung ohne Beschränkung anhand von Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die in den Figuren dargestellten Abbildungen detaillierter beschrieben.

In den Figuren zeigt:

[0049] Abb. 1: den spezifischen Nachweis einer bekannten Sequenz.

[0050] Abb. 2: eine Allotypbestimmung durch spezifische Bestimmung der Identität eines 3'-ständigen Nucleotids mittels Primerfamilien.

[0051] Abb. 3: eine sog. "Sequence Tag Aquisition", d.h. eine spezifische Signatur-Sequenzierung ausgehend von einer bekannten Primersequenz mittels Primerfamilien.

[0052] Abb. 4: eine Signatur-Sequenzierung ausgehend von einer unbekannten Sequenz mittels Primer-Hexameren.

[0053] Abb. 5: das Zusammenführen der durch die Signatur-Sequenzierung gemäß Abb. 4 erhaltenen Einzelergebnisse zur Generierung einer kontinuierlichen Sequenzabfolge.

[0054] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des er-

findungsgemäßen Verfahrens zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation liegen die  $x$  äußeren PCR-Primer  $P_11, P_21, P_12, P_22, P_13, P_23, \dots P_1x, P_2x$  gegenüber den  $x$  inneren PCR-Primern  $P_31, P_32, P_33, \dots P_3x$  in einem  $10^2$ - bis  $10^{12}$ -fachen, z.B. in einem  $10^4$ -fachen, Überschuß vor. Dadurch läuft die PCR am Anfang verstärkt in der flüssigen Phase ab. Mit zunehmender Amplikon-Konzentration findet die PCR aber zunehmend auf der Festphasenoberfläche statt und entspricht dort einer verschachtelten PCR.

**[0055]** Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation sind die Schmelztemperaturen ( $T_m$ ) der zwei äußeren PCR-Primer  $P_1$  und  $P_2$  gegenüber derjenigen des inneren Primers  $P_3$  unterschiedlich. Beispielsweise haben die äußeren PCR-Primer eine höhere Schmelztemperatur als der innere PCR-Primer. Der Reaktionsverlauf kann dann so eingestellt werden, daß zunächst bei erhöhter Temperatur nur die äußeren PCR-Primer binden bzw. "annealen" und verlängert werden. Nach der entsprechenden PCR-Zyklenzahl wird dann die Temperatur gesenkt, so daß auch der innere PCR-Primer an sein "Template" binden und die für die Bestimmung gewünschten Extensionsprodukte bilden kann.

**[0056]** Auch die verschiedenen Festphasenprimer  $P_3$  untereinander können unterschiedliche Schmelztemperaturen aufweisen. Daher ist es möglich, die Reaktion so zu steuern, daß nur an bestimmten definierten Positionen des DNA-Microarrays eine Amplifikation stattfindet. Durch die Erstellung von Amplifikationsprofilen können gewünschtenfalls die unterschiedlichen Eigenschaften der Festphasenprimer wie z.B. Basenzusammensetzung, G-C Gehalt und Länge berücksichtigt werden.

**[0057]** Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation unterliegt die Festphase bzw. der feste Träger keinen besonderen Beschränkungen und kann beispielsweise unter Metall (z.B. Aluminium oder Gold) oberflächen, mit  $SiO_2$  bedampften Metalloberflächen, Metall/Halbmatalloxid (z.B.  $Al_2O_3$  oder  $SiO_2$ ) oberflächen, Glasoberflächen, Polymeroberflächen, z.B. in Foliennform, Nylonmembranen oder Nitrocellulosemembranen ausgewählt werden. Dem Fachmann ist aber klar, daß sich grundsätzlich auch "halbfeste" oder gelartige Träger eignen. Wichtig ist nur, daß eine örtliche Fixierung bzw. räumliche Lokalisierung der Nachweisreaktion möglich ist.

**[0058]** Ein erfindungsgemäß bevorzugt geeigneter gelartiger Träger kann z.B. hergestellt werden, indem auf einem herkömmlichen festen Träger an sich bekannte Polymerisationsinitiatoren immobilisiert werden, an die dann entsprechende Monomere unter Bildung von sog. "Polymer Brushes" polymerisiert werden. Diese Monomeren können zum einen funktionelle Gruppen

aufweisen, über die eine Vernetzung der "Polymer Brushes" miteinander möglich ist, und zum anderen funktionelle Gruppen haben, die zur Immobilisierung von Sonden-Molekülen, z.B. Oligonucleotiden oder Antikörpern, dienen (Linker-Gruppen). In wäßriger Phase quillt die Schicht aus "Polymer Brushes" auf der Oberfläche des festen Trägers gelartig auf. Mit "Polymer Brushes" lassen sich erheblich höhere Propfdichten auf der Trägeroberfläche erreichen als unter Verwendung der konventionellen, sich selbst organisierenden Monoschichten (engl. "Selfassembled Monolayers", "SAMs") aus bifunktionellen Molekülen (engl. "Linker"). Auch die Kopplungsdichte in bezug auf die Proben- oder Sondenmoleküle ist erheblich höher. Einzelheiten zur "Polymer Brush"-Technik sind in der WO 00/43539 beschrieben, auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

**[0059]** Bevorzugt wird Glas verwendet, da es keine poröse Oberfläche hat, in deren Poren die Ziel-DNA diffundieren könnte und dadurch langsamer ihre entsprechende Sonde findet. Außerdem ist Glas mechanisch stabil, temperaturbeständig, unempfindlich gegenüber stringenten Waschbedingungen und hat eine geringe Eigenfluoreszenz. Es sind alle Glasarten oder -sorten geeignet, z.B. Quarzglas.

**[0060]** Die Polymeroberfläche kann z.B. aus Polypropylen, Polymethylmethacrylat (PMMA) (Acryl- bzw. Plexiglas) oder Cycloolefin-Copolymeren (COCs) bestehen. Ein geeignetes COC ist beispielsweise von Ticona unter dem Handelsnamen "Topaz" erhältlich.

**[0061]** Die genauen Sequenzen der äußeren und inneren Primer bzw. Sonden wählt der Fachmann nach Maßgabe des konkreten analytischen Problems. Beispielsweise kann es sich um Sequenzen handeln, die an für die nachzuweisenden oder zu differenzierenden Mikroorganismen spezifische DNA-Sequenzen hybridisieren. Organismenspezifische Sequenzen können beispielsweise durch Sequenzdatenbankvergleiche und ggf. "Alignment" ermittelt werden. Grundsätzlich besteht keine Beschränkung auf DNA oder allgemein Nucleinsäuren als Sonden. Es können wegen der bekannten Vorteile auch DNA-PNA (Peptidnucleinsäure)-Hybride bzw. -Chimäre verwendet werden. Ferner können auch modifizierte Nucleotide (z.B. dl, dl-Biotin, dU, dU-Biotin) eingesetzt werden.

**[0062]** Die direkte oder indirekte Immobilisierung der Biomoleküle mit oder ohne Spacer an der Oberfläche des festen Trägers erfolgt erfindungsgemäß durch kovalente Bindung und betrifft gleichermaßen sowohl die in situ-Synthese von z.B. Oligonucleotiden als auch das Aufpropfen zuvor synthetisierter Nucleotidfolgen unabhängig von der jeweiligen Länge und tatsächlichen Beschaffenheit der als Sonden und/oder Primer dienenden Nucleinsäuren.

**[0063]** Beispielsweise kann ein Glasträger in eine Lösung von bifunktionellen Molekülen (sog. "Linker"), die z.B. eine Halogensilan- (z.B. Chlorsilan-) oder Alkoxy-silangruppe zur Kopplung an die Glasoberfläche aufweisen, getaucht werden.

[0064] Das verwendbare bifunktionelle Silan unterliegt keinen besonderen Beschränkungen. In Frage kommen alle Silane, die am Siliciumatom ein(e), zwei oder drei hydrolysierbare(s) Atom(e) oder Gruppe(n) aufweisen, beispielsweise Halogenatome, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Acyloxy- oder Aminogruppen.

[0065] Konkret kann zum Beispiel Isocyanopropyltrimethoxysilan oder 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan auf einen Glasträger aufgebracht werden.

[0066] Die zweite funktionelle Gruppe des bifunktionellen Silans unterliegt ebenfalls keinen besonderen Beschränkungen und wird nach Maßgabe des zu immobilisierenden Proben- oder Sondenmoleküls (z.B. Nucleinsäuren) gewählt. Beispiele sind zu nucleophilen Substitutionsreaktionen, nucleophilen Additionsreaktionen, Diels-Alder-Reaktionen oder radikalischen Substitutionsreaktionen fähige reaktive Gruppen. Konkrete Beispiele sind reaktive Doppelbindungen, Diengruppen, dienophile Gruppen, Epoxy-, Aldehyd- Hydroxy-, Carbonsäure-, Aktivester-, Amino, Disulfid-, Thiol-, Aziridin-, Azlacton-, Isocyanat-, Isothiocyanat-, Azidgruppen und reaktive Austrittsgruppen.

[0067] Diese und weitere bifunktionelle Linker für die Kopplung einer Vielzahl von Proben- oder Primer/Sonden-Molekülen, insbesondere auch biologischen Ursprungs, an eine Vielzahl von Trägeroberflächen sind dem Fachmann gut bekannt, vgl. beispielsweise "Bioconjugate Techniques" von G. T. Hermanson, Academic Press 1996.

[0068] Für Nylonmembranen können z.B. Oligonucleotide mit Oligo-(dT)-Schwanz am 5'-Ende verwendet werden. Durch UV-Bestrahlung werden die Thymin-Basen des Oligo-(dT)-Schwanzes kovalent mit primären Aminen in der Nylonmembran verknüpft.

[0069] Bei einer bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation liegen auf dem verwendeten Festphasen-DNA-Microarray alle oder einzelne der zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen PCR-Reagenzien bzw. -Komponenten, d.h. die DNA-Polymerase, z. B. die thermostabile Taq-Polymerase (DNA-Polymerase aus *Thermus aquaticus*), geeignete Puffersubstanzen und sämtliche Desoxynucleosidtriphosphate und die x äußeren Primer, stabil und reversibel dehydratisiert auf der Oberfläche vor.

[0070] Es können beliebige, beispielsweise handelsübliche, PCR-Reagenzien verwendet werden. Die Aufbringung auf den festen Träger erfolgt nach herkömmlichen Verfahren, beispielsweise durch Aufpipettieren. Anschließend wird dehydratisiert, beispielsweise durch Trocknen an der Luft, im Vakuum oder im Trockenschrank, über einem üblichen Trocknungsmittel in einen Exsikkator oder durch Lyophilisation (Gefriertrocknung). Die Lyophilisation ist bevorzugt, da es sich um ein besonders schnelles und schonendes Dehydratisierungsverfahren handelt. Die Endkonzentrationen können einfach eingestellt werden, indem die PCR-Reagen-

zien in so konzentrierter Form aufgebracht werden, daß sich nach der Rehydratisierung in einem bestimmten Volumen Flüssigkeit die gewünschten Reaktionsparameter wie insbesondere Konzentrationen und pH-Wert ergeben.

[0071] Die Aufbringung kann auch räumlich getrennt erfolgen.

[0072] Die PCR-Reagenzien sind auf dem festen Träger über lange Zeit, z.B. mindestens 6 Monate, ohne Kühlung stabil.

[0073] Die inneren Primer sind geeigneterweise bereits im voraus (d.h. vor der Aufbringung und Dehydratisierung der PCR-Reagenzien) kovalent auf der Oberfläche des festen Trägers gebunden bzw. immobilisiert.

[0074] Im Gebrauch werden die in der zu analysierenden Probe gegebenenfalls vorhandenen Proben-Nucleinsäuren in wäßriger Lösung zugegeben, wodurch die PCR-Reagenzien rehydrieren und die Amplifikation im Falle des Vorhandenseins einer vom Design des analytischen Ansatzes antizipierten "Template"-Gegensequenz auf dem festen Träger abläuft, ohne daß die Zugabe weiterer Reagenzien notwendig ist.

[0075] Die Analyse/Detektion erfolgt nach einer bevorzugten Ausführungsform mit Hilfe von kovalent an dem Festphasen-DNA-Microarray als Extensionsprodukte gebildeten und markierten DNA-Sequenzen und durch Bestimmung der Lokalisierung der Markierung auf der Oberfläche wie beispielsweise aus EP 0 373 203 bekannt.

[0076] Beispielsweise kann ein Fluorochrom als Marker in das Amplikon eingebaut werden, dessen Fluoreszenzemission dann detektiert oder gemessen wird. Da der Einbau der Markierung ortsgebunden erfolgt, können die Markierungsreaktionen, gewünschtenfalls auch in Echtzeit, nachgewiesen bzw. beobachtet werden.

[0077] Die Markierungs- und Detektionstechniken unterliegen keinen besonderen Beschränkungen. Beispielsweise können radioaktiv oder fluoreszenzmarkierte Nucleotide verwendet werden. Die Fluoreszenzmarkierung hat dabei den Vorteil, daß keine besonderen Schutzvorkehrungen wie beim Arbeiten mit radioaktivem Material getroffen werden müssen. Der Nachweis der Hybridisierung kann beispielsweise durch konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie erfolgen.

[0078] Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von digoxigeninmarkierten spezifischen Sonden (Oligonucleotiden). Der Nachweis der Hybridisierung kann hier beispielsweise durch eine sich anschließende Antikörper- und Farbreaktion erfolgen, z.B. mit Hilfe eines poly- oder monoklonalen Digoxigenin-Antikörpers, der z.B. mit alkalischer Phosphatase konjugiert ist. Die alkalische Phosphatase setzt beispielsweise Nitroblauetrazoliumchlorid (NBT) oder 5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP) unter Bildung eines blauen Farbstoffs um.

[0079] Der zur Ausführung eines der erfindungsgemäßen Verfahren vorgeschlagene Festphasen-DNA-Microarray liegt in weiterer Ausgestaltung in



Form eines sog. "Lab-on-a-Chip"-Systems vor, bei dem alle notwendigen Einrichtungen zum Mischen der Reaktionsteilnehmer sowie zur Temperaturregelung, ggf. einschließlich einer Steuereinheit für einzelne oder alle Einrichtungen, auf dem Microarray integriert sind. Ein solches, für den erfindungsgemäßen Einsatz grundsätzlich geeignetes System wird beispielsweise von Köhler et al. in transcript Laborwelt, Nr. 2 (2000), S. 5 ff. "Chipthermocycler" beschrieben und kann vom Fachmann in Kenntnis der vorliegenden Erfindung ohne zumutbaren Aufwand leicht konfiguriert und betrieben werden. Alternativ kann die Steuerung der erforderlichen Verfahrensparameter vollständig oder teilweise extern wie z.B. in einer Rechneranlage erfolgen.

**[0080]** Kurz zusammengefaßt vereinen das allgemeine erfindungsgemäße Verfahren zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation durch verschachtelte PCR in einem kombinierten Flüssigphasen/Festphasen-DNA-Microarraysystem sowie die für bestimmte Anwendungsgebiete modifizierten Ableitungen desselben in sich die Sensitivität der PCR, die Parallelität der Mikroarrayanalytik und die Spezifität des Systems Primer/"Template"/Polymerase mit dem Vorteil der stabilen dehydrierten Bindung von Reagenzien auf einem Microarray.

**[0081]** Die vorliegende Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele unter Bezugnahme auf die anhängenden Figuren nachfolgend näher erläutert. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beispiele lediglich der Veranschaulichung einzelner bestimmter Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung dienen, nicht aber als Beschränkung des allgemeinen erfinderischen Gedankens aufgefasst werden soll. Vom Fachmann können zahlreiche Modifikationen und Optimierungen der konkreten Ausführungsbeispiele vorgenommen werden, ohne den Schutzbereich der vorliegenden Erfindung, der allein durch die anhängenden Ansprüche festgelegt wird, zu verlassen.

#### Beispiel 1

**[0082]** Abb.1: Spezifischer Nachweis einer bekannten Sequenz. Die obere Hälfte der Abb. schematisiert die Vorgänge während der Amplifikation, die untere Hälfte die Situation zum Zeitpunkt der Detektion. Es sind mindestens 1 Lösungsprimerpaar ( $P_1$  und  $P_2$ ) und mindestens 1 Festphasenprimer ( $P_3$ ) vorhanden.  $P_3$  hat seine Binderegion innerhalb des Amplikons, welches von  $P_1$  und  $P_2$  amplifiziert wird. Da nach jedem Zyklus bei 90 - 95°C denaturiert wird, was extremen Waschschritten (strippen) entspricht, bleiben nach Ende der Reaktion nur die kovalent gebundenen Reaktionsprodukte an der Festphase zurück (vgl. Abb. 1 unten). Alle anderen Reaktionsprodukte befinden sich im Überstand und bleiben bei der Detektion unberücksichtigt.

**[0083]** Das vorliegende Beispiel betrifft den spezifischen Nachweis der Anwesenheit einer bekannten, für Salmonellen charakteristischen Sequenz in einer zu

analysierenden Lebensmittelprobe. Die Aufbereitung des Probenmaterials erfolgt in Übereinstimmung mit der DIN-Vorschrift 10135, welche speziell den Nachweis von Salmonellen betrifft.

**[0084]** Die in 100 µl wässriger Lösung aufgenommene Proben-DNA wird auf einen Microarray aus aktiviertem Glas, auf dem sich bereits sämtliche übrigen Reaktionsteilnehmer in lyophilisierter Form befinden, wobei alle Komponenten mit Ausnahme der kovalent an der festen Phase gebundenen  $P_3$ -Primer reversibel immobilisiert sind, aufpipettiert.

**[0085]** Durch Zugabe der Probenlösung werden die lyophilisierten Komponenten rehydratisiert und stehen dem folgenden Reaktionsablauf mit folgenden Konzentrationen zur Verfügung. Die Primer  $P_1$  und  $P_2$  liegen in Konzentrationen von 100 nM bzw. 600 nM vor, während der Primer  $P_3$  eine Konzentration von 50 pM aufweist. In der wässrigen Probenlösung mit einem pH-Wert von 8,3 befinden sich die üblichen PCR-Standardpufferkomponenten 50 mM KCl, 10 mM Tris/HCl, 1,5 mM  $MgCl_2$ , sowie die drei Nucleotide dATP, dCTP und dGTP in einer jeweiligen Konzentration von 200 µM. Die dTTP-Konzentration des Systems beträgt 75 µM, diejenige an Biotin-dUTP beträgt 50 µM. Weiterhin umfasst das System 6,4 Einheiten (units) Taq-Polymerase (AmpliTaQ™ - Gold, Perkin-Elmer).

**[0086]** Die Reaktion wird durch eine 10 Minuten lange Aktivierung der Polymerase gestartet und läuft bei einer jeweiligen Annealingtemperatur von 65°C und einer jeweiligen Denaturierungstemperatur von 94°C über 50 Zyklen, wobei ein jeder Zyklus unter Verwendung eines Thermocyclers PTC 200 (MJ Research) die folgenden Inkubationszeiten umfasst: 45 Sekunden 94°C, 60 Sekunden 65°C, 120 Sekunden bei 72°C.

**[0087]** Das in die kovalent gebundenen Produkte eingebaute Biotin wird nach der Reaktion mittels Streptavidin-Fluorochrom-Konjugat in an sich bekannter Weise angefärbt und einer Detektion zugeführt.

#### Beispiel 2

**[0088]** Abb.2: Allotypbestimmung: Spezifische Bestimmung der Identität eines 3'-ständigen Nucleotids mittels Primerfamilien. Die obere Hälfte der Abb. schematisiert die Vorgänge während der Amplifikation, die untere Hälfte die Situation zum Zeitpunkt der Detektion.

**[0089]** Unter den in Beispiel 1 genannten Reaktionsbedingungen wird eine Konsensus-PCR (vgl. z.B. P. Wordsworth, "Techniques used to define human MHC antigens: polymerase chain reaction and oligonucleotide probes", *Immunol Lett*, 1991 Jul;29(1-2):37-9) durchgeführt, bei der alle 300 Varianten vom insgesamt 270 Nucleotide umfassenden Exon II des DR-Gens (HLA-Klasse II) amplifiziert werden. Die intern bindenden Festphasenprimer  $P_3$  besitzen Längen von 18 bis 27 Nucleotide und sind Mitglieder von insgesamt 250 Familien, deren Anzahl benötigt wird, um über Redundanzen eine eindeutige Identifizierung eines Genotyps

auch bei Heterozygotie zu ermöglichen, wobei sich jedes einzelne Mitglied der Primerfamilie hinsichtlich des Nukleotids an seinem 3'-Ende von jedem anderen Mitglied unterscheidet (vgl. Abb. 2).

**[0090]** Aufgrund der im wesentlichen gleichen Länge der vorhandenen Primer beträgt die Annealingtemperatur der Amplifikationsreaktion 65°C, so daß die gewünschten Extensionsprodukte unter den gewählten Bedingungen bevorzugt nur an denjenigen definierten Positionen des DNA-Microarrays gebildet werden, welche durch die Anwesenheit des zu der zu bestimmenden Variantensequenz im wesentlichen exakt komplementären Primers gekennzeichnet sind.

**[0091]** Im Anschluss an die Detektion gemäß Beispiel 1 wird das erhaltene Fluoreszenzmuster mit den anhand der Einzelsequenzen der verschiedenen Allele zu erwartenden Signalmusterpermutationen verglichen. Die jeweils durch den Vergleich aufgefundenen Übereinstimmungen ermöglichen die zweifelsfreie Identifizierung der zu untersuchenden Genotyp-Varianten.

#### Beispiel 3

**[0092]** Abb.3: "Sequence Tag Aquisition": Spezifische Signatur-Sequenzierung ausgehend von einer bekannten Primersequenz mittels Primerfamilien. Die obere Hälfte der Abb. schematisiert die Vorgänge während der Amplifikation, die untere Hälfte die Situation zum Zeitpunkt der Detektion. In der oberen Hälfte sind die Nebenreaktionen an der Festphase im Gegensatz zu Abb. 1 und 2 aus Übersichtgründen nicht dargestellt.

**[0093]** Wie bei Beispiel 2 wird eine Konsensus-PCR durchgeführt. In diesem Fall wird die 16S-rDNA eines unbekannten Bakteriums amplifiziert. Das Amplikon ist in diesem Fall ca. 1200 bp lang. Sequenziert werden soll jedoch lediglich ein interner Bereich von 6 Nukleotiden in einem variablen, d.h. nicht konservierten Bereich. Dieser unbekannte Sequenzabschnitt wird ausgehend von einer konservierten Region ermittelt. Hierzu werden Festphasenprimerfamilien verwendet, die sich, ausgehend von einer konservierten Region, am 3'-Ende jeweils durch die letzte Base unterscheiden, so daß sich insgesamt 4<sup>6</sup> entsprechend 4096 Varianten ergeben (vgl. Abb. 3). Die Annealingtemperatur und die Gesamtlänge der Primer sind an die gewünschte Spezifität angepasst (s. Beispiel 2). Wie in Beispiel 2 angegeben, weisen die Primer Längen zwischen 18 und 27 Nukleotiden auf.

**[0094]** Die Detektion erfolgt wie zuvor in Beispiel 2 beschrieben.

**[0095]** Die Auswertung der erhaltenen Daten erfolgt auf der Grundlage des Microarray-Designs. Durch die vom Design vorgegebene Gruppierung der einzelnen Reaktionsbereiche in Felder, die mit der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Position der zu bestimmenden Sequenz korrespondieren, erfolgt die Bestimmung des 6 Nukleotide umfassenden DNA-Teilbereichs durch sukzessives Ablesen der für jedes Feld er-

haltenen Daten. Mit anderen Worten wird zuerst das Feld ausgewertet, in welchem ausgehend vom Design des Arrays die erste zu bestimmende Base ermittelt wird, bevor in Kenntnis des Ergebnisses aus diesem ersten Feld die Bestimmung der Base an der zweiten Position der zu ermittelnden Sequenz vorgenommen wird, u.s.w. Die jeweilige Untersuchung eines Feldes erfolgt durch Erfassung und Zuordnung der größten gemessenen Signalstärke. Selbstverständlich können die Feldmessungen auch parallelisiert ablaufen. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auf Abb. 3 verwiesen.

#### Beispiel 4

**[0096]** Abb.4: Signatur-Sequenzierung ausgehend von einer unbekannten Sequenz mittels Primer-Hexameren. Die obere Hälfte der Abb. schematisiert die Vorgänge während der Amplifikation, die untere Hälfte die Situation zum Zeitpunkt der Detektion. In der oberen Hälfte sind die Nebenreaktionen an der Festphase im Gegensatz zu Abb. 1 und 2 aus Übersichtgründen nicht dargestellt.

**[0097]** Eine unbekannte Sequenz wird mittels spezifischer Primer nach inverser PCR amplifiziert. Die inverse PCR ist im Stand der Technik bekannt (vgl. z.B. C. R. Newton, A. Graham: "PCR", Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin Oxford 1994, Seite 120ff. und die dort angegebenen weiteren Literaturstellen). In diesem Fall wird die "Border"-Sequenz eines integrierten Transgenkonstruktes im Mais-Kerngenom bestimmt. Das Amplikon umfaßt 500 bp. Die Festphasenprimer P<sub>3</sub> sind alle 6 Nucleotide lang und unterscheiden sich in ihrer Sequenz. Es sind 4096 unterschiedliche Festphasenprimervarianten auf dem Chip. Es werden 1000 Kopien der Mais-DNA eingesetzt. Wiederum werden Standard-PCR-Bedingungen angewandt (s.o.). Allerdings wird die Annealingtemperatur nach Zyklus 20 auf 30°C erniedrigt, um die Festphasen-Amplifikation mit den Hexameren zu begünstigen.

**[0098]** Die Bestimmung der Sequenz erfolgt anschließend durch Ermittlung der spezifisch gebildeten Extensionsprodukte, Zuordnung dieser ermittelten Werte zu den definierten Positionen des DNA-Microarrays, und Zusammenstellung der zu bestimmenden Sequenz im Rahmen einer ggf. Computer-unterstützten Kombinatorik, wobei die tatsächliche Aneinanderreihung der Einzeldaten zur Gesamtsequenz unter Nutzung der jeweils überlappenden Sequenzbereiche vorgenommen wird.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur spezifischen Bestimmung von DNA-Sequenzen mittels paralleler Amplifikation in einem kombinierten Flüssigphasen/Festphasen-DNA-Microarraysystem, indem man eine verschachtelte Polymerasekettenreaktion unter Verwendung von x PCR-Primersätzen aus jeweils min-

destens 3 PCR-Primern  $P_11$ ,  $P_21$ ,  $P_31$ ,  $P_12$ ,  $P_22$ ,  $P_32$ ,  $P_13$ ,  $P_23$ ,  $P_33$ , ...  $P_1x$ ,  $P_2x$ ,  $P_3x$  durchführt, wobei  $x$  eine natürliche Zahl bedeutet und der Anzahl der zu bestimmenden DNA-Sequenzen entspricht, und wobei für jeden der  $x$  PCR-Primersätze

(a) zwei äußere PCR-Primer  $P_1$ ,  $P_2$  so ausgewählt werden, daß sie an stromaufwärts und stromabwärts der zu amplifizierenden Ziel-DNA-Sequenz liegende DNA-Teilsequenzen hybridisieren,

(b) ein innerer PCR-Primer  $P_3$  so ausgewählt wird, daß er an eine innerhalb der zu bestimmenden Ziel-DNA-Sequenz liegende DNA-Teilsequenz hybridisiert und in der Lage ist, ein  $P_3$ -Extensionsprodukt zu bilden, und

(c) die  $x$  äußeren PCR-Primer  $P_11$ ,  $P_21$ ,  $P_12$ ,  $P_22$ ,  $P_13$ ,  $P_23$ , ...  $P_1x$ ,  $P_2x$  in der flüssigen Phase gegenüber den  $x$  inneren PCR-Primern  $P_31$ ,  $P_32$ ,  $P_33$ , ...  $P_3x$  im Überschuß vorliegen, und

(d) die  $x$  inneren PCR-Primer  $P_31$ ,  $P_32$ ,  $P_33$ , ...  $P_3x$  an  $x$  räumlich beabstandeten definierten Positionen unter Bildung eines DNA-Microarrays irreversibel an eine Festphase gebunden vorliegen, und

(e) man die Bestimmung durch Ermittlung des Vorhandenseins eines  $P_3$ -Extensionsproduktes an der definierten Position des DNA-Microarrays durchführt.

## 2. Verfahren zur Bestimmung von Punktmutationen mittels paralleler Amplifikation, bei dem man

(a) unter Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 eine Polymerasekettenreaktion durchführt, durch welche sämtliche  $x$  zu bestimmenden Varianten amplifiziert werden, wobei

(b) mindestens  $P_3x$  Primerfamilien verwendet werden, wobei sich jedes einzelne Mitglied  $P_3x-N$  der Primerfamilie hinsichtlich des Nukleotids an seinem 3'-Ende von jedem anderen Mitglied unterscheidet, wobei  $N$  die unterschiedlichen Nukleotide A, C, G und T bezeichnet, und die Annealingtemperatur der Amplifikationsreaktion so ausgewählt wird, daß die gewünschten Extensionsprodukte nur an denjenigen definierten Positionen des DNA-Microarrays gebildet werden, welche durch die Anwesenheit des zu der zu bestimmenden Punktmutation im wesentlichen exakt komplementären Primers gekennzeichnet sind,

(c) zur Amplifikation eine DNA-Polymerase ohne 3'→5'-Exonuclease-Aktivität verwendet wird, und

(d) die Bestimmung der Punktmutation gemäß Schritt (e) des Anspruchs 1 erfolgt.

## 3. Verfahren zur Bestimmung der Sequenz von DNA-Teilbereichen mittels paralleler Amplifikation, bei dem

(a) unter Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 eine Polymerasekettenreaktion durchgeführt wird, durch welche sämtliche  $x$  zu bestimmenden Sequenzen amplifiziert werden, wobei

(b) mindestens  $P_3x$  Primerfamilien verwendet werden, wobei sich jedes einzelne Mitglied  $P_3x-N$ , ...  $P_3x-Nn$  der Primerfamilie hinsichtlich seiner 1 bis  $n$  Nukleotide am 3'-Ende von jedem anderen Mitglied unterscheidet, wobei  $N$  die unterschiedlichen Nukleotide A, C, G und T bezeichnet, und  $n$  die Länge der zu bestimmenden Sequenz(en) angibt, und die Annealingtemperatur der Amplifikationsreaktion so ausgewählt wird, daß die gewünschten Extensionsprodukte nur an denjenigen definierten Positionen des DNA-Microarrays gebildet werden, welche durch die Anwesenheit des zu der zu bestimmenden Sequenz im wesentlichen exakt komplementären Primers gekennzeichnet sind,

(c) zur Amplifikation eine DNA-Polymerase ohne 3'→5'-Exonuclease-Aktivität verwendet wird, und

(d) die Ermittlung der zu bestimmenden Sequenz(en) gemäß Schritt (e) des Anspruchs 1 erfolgt.

## 4. Verfahren zur Bestimmung der Sequenz von unbekannten DNA-Teilbereichen mittels paralleler Amplifikation, bei dem

(a) unter Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 eine Polymerasekettenreaktion durchgeführt wird, durch welche die Abfolge sämtlicher  $n$  Nukleotide der zu bestimmenden Sequenzen ermittelt wird, wobei

(b) ein sämtliche Permutationen umfassender Satz von inneren Primern  $P_3$  mit einer bestimmten Länge  $n$  verwendet wird, wobei mehrere Primer mit einer jeweils unterschiedlichen Region der zu bestimmenden Sequenz exakt hybridisieren und Extensionsprodukte definierter

Länge bilden können, und sich jeder einzelne dieser Primer an einer anderen definierten Position des DNA-Microarrays befindet,

(c) zur Amplifikation eine DNA-Polymerase ohne 3'→5'-Exonuclease-Aktivität verwendet wird, und

(d) die Bestimmung der Sequenz durch Ermittlung der in Schritt (b) gebildeten Extensionsprodukte, Zuordnung dieser ermittelten Werte zu den definierten Positionen des DNA-Microarrays, und Zusammenstellung der zu bestimmenden Sequenz im Rahmen einer ggf. Computer-unterstützten Kombinatorik erfolgt, wobei die tatsächliche Aneinanderreihung der Einzeldaten zur Gesamtsequenz unter Nutzung der jeweils überlappenden Sequenzbereiche vorgenommen wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die x äußeren PCR-Primer  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_3$ , ...  $P_1x$ ,  $P_2x$  gegenüber den x inneren PCR-Primern  $P_3$ ,  $P_3$ ,  $P_3$ , ...  $P_3x$  in einem  $10^2$ - bis  $10^{12}$ -fachen, vorzugsweise in einem  $10^4$ -fachen Überschuß vorliegen.
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Schmelztemperaturen der zwei äußeren PCR-Primer  $P_1$  und  $P_2$  gegenüber derjenigen des inneren Primers  $P_3$  unterschiedlich sind.
7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Festphase unter Metalloberflächen, mit  $\text{SiO}_2$  bedampften Metalloberflächen, Metall/Halbmatalloxidoberflächen, Glasoberflächen, Polymeroberflächen, Nylonmembranen oder Nitrocellulosemembranen ausgewählt ist.
8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Metalloberfläche aus Aluminium oder Gold, die Metall/Halbmatalloxidoberfläche aus  $\text{Al}_2\text{O}_3$  oder  $\text{SiO}_2$ , die Glasoberfläche aus Quarzglas und die Polymeroberfläche aus Polypropylen, Polymethylmethacrylat oder Cycloolefin-Copolymeren ist.
9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die x inneren PCR-Primer  $P_3$ ,  $P_3$ ,  $P_3$ , ...  $P_3x$  an eine Metall/Halbmatalloxidoberfläche oder Glasoberfläche über ein bifunktionelles Silan, das am Siliciumatom ein(e), zwei oder drei hydrolysierbare(s) Atom(e) oder Gruppe(n) aufweist, gebunden sind.
10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die hydrolysierbaren Atome oder Gruppen Halogenatome,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkoxy-,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Acyloxy- oder Aminogruppen umfassen.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei die zweite funktionelle Gruppe des bifunktionellen Silans nucleophile Substitutionsreaktionen, nucleophile Additionsreaktionen, Diels-Alder-Reaktionen oder radikalische Substitutionsreaktionen eingehen kann.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei es sich bei der zweiten funktionellen Gruppe des bifunktionellen Silans um eine reaktive Doppelbindung, Diengruppe, dienophile Gruppe, Epoxy-, Aldehyd-, Hydroxy-, Carbonsäure-, Aktivester-, Amino, Disulfid-, Thiol-, Aziridin-, Azlacton-, Isocyanat-, Isothiocyanat-, Azidgruppe oder reaktive Austrittsgruppe handelt.

13. Festphasen-DNA-Microarray zur Ausführung eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, auf dem an x räumlich beabstandeten Positionen x innere PCR-Primer  $P_3$ ,  $P_3$ ,  $P_3$ , ...  $P_3x$  irreversibel an die Festphase gebunden sind.

14. Festphasen-DNA-Microarray nach Anspruch 13, bei dem außerdem einzelne oder alle der für die durchzuführenden Reaktion(en) erforderlichen Komponenten wie DNA-Polymerase, geeignete Puffer-substanzen, sämtliche Desoxynucleosidtriphosphate und die x äußeren PCR-Primer  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_3$ , ...  $P_1x$ ,  $P_2x$  reversibel dehydratisiert auf der Oberfläche vorliegen.

15. Festphasen-DNA-Microarray nach Anspruch 13 oder 14 in Form eines "Lab-on-a-Chip"-Systems, bei dem ferner Einrichtungen zum Heizen, Kühlen, Temperaturregeln, Mischen und Messen auf dem Microarray integriert sind.

Abb. 1




Abb.2




Abb.3






Abb.4





## Abb.5





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 11 9182

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	WO 90 11369 A (HOLMES MICHAEL JOHN ;CEMU BIOTEKNIK (SE)) 4. Oktober 1990 (1990-10-04) * das ganze Dokument *	1-15	C12Q1/68
Y	WO 98 28438 A (BARNARD ROSS THOMAS ;WALSH TERENCE PATRICK (AU); DIATECH PTY LTD ( ) 2. Juli 1998 (1998-07-02) * das ganze Dokument *	1-15	
Y	WO 99 05321 A (TABONE JOHN C ;RAPIGENE INC (US); MOYNIHAN KRISTEN (US); NESS JEFF) 4. Februar 1999 (1999-02-04) * das ganze Dokument *	1-15	
Y	WO 96 31622 A (ISIS INNOVATION ;SOUTHERN EDWIN MELLOR (GB); PRITCHARD CLARE ELIZA) 10. Oktober 1996 (1996-10-10) * das ganze Dokument *	1-15	
Y	HEAD ET AL: "NESTED GENETIC BIT ANALYSIS (N-GBA) FOR MUTATION DETECTION IN THE p53 TUMOR SUPPRESSOR GENE" NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, Bd. 25, Nr. 24, 1997, Seiten 5065-5071, XP002144794 ISSN: 0305-1048 * das ganze Dokument *	1-15	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C12Q
Y	WO 96 26291 A (UNIV NOTTINGHAM ;BARDSLEY RONALD GEORGE (GB); LOCKLEY ANDREW KEITH) 29. August 1996 (1996-08-29) * das ganze Dokument *	1-15	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>17. Mai 2001</b>	Prüfer <b>Hagenmaier, S</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 11 9182

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	WO 96 04404 A (MOSAIC TECHNOLOGIES INC ; WHITEHEAD FOR BIOMEDICAL RESEA (US); ADAM) 15. Februar 1996 (1996-02-15) * das ganze Dokument *	1-15	
Y	WO 93 21339 A (UNIV LONDON ; TEDDER RICHARD SEATON (GB); LOVEDAY CLIVE (GB); KAYE) 28. Oktober 1993 (1993-10-28) * das ganze Dokument *	1-15	
A	NEWTON: "PCR" 1997, BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS, OXFORD XP002167652 3.7 Verschachtelte PCR * Seite 62 *		
D,A	CHENG J ET AL: "CHIP PRC II. INVESTIGATION OF DIFFERENT PCR AMPLIFICATION SYSTEMS IN MICROFABRICATED SILICON-GLASS CHIPS" NUCLEIC ACIDS RESEARCH, GB, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, Bd. 24, Nr. 2, 1996, Seiten 380-385, XP000578332 ISSN: 0305-1048 * das ganze Dokument *		
D,A	SHOFFNER M A ET AL: "CHIP PCR.I. SURFACE PASSIVATION OF MICROFABRICATED SILICON-GLASS CHIPS FOR PCR" NUCLEIC ACIDS RESEARCH, GB, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, Bd. 24, Nr. 2, 1996, Seiten 375-379, XP000605272 ISSN: 0305-1048 * das ganze Dokument *		
-/--			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>17. Mai 2001</b>	
		Prüfer <b>Hagenmaier, S</b>	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet  Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie  A : technologischer Hintergrund  O : mündliche Offenbarung  P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze  E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  D : in der Anmeldung angeführtes Dokument  L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument  &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches  
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 11 9182

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	WO 93 09250 A (ADELAIDE CHILDREN S HOSPITAL ;UNIV SOUTH AUSTRALIA (AU)) 13. Mai 1993 (1993-05-13) * das ganze Dokument *		
A	WO 97 32040 A (STIRLING DAVID ;LUDLAM CHRISTOPHER ARMSTRONG (GB); ROYAL INFIRMARY) 4. September 1997 (1997-09-04) * das ganze Dokument *		
T	STRIZHKOV BORIS N ET AL: "PCR amplification on a microarray of gel-immobilized oligonucleotides: Detection of bacterial toxin- and drug-resistant genes and their mutations." BIOTECHNIQUES, Bd. 29, Nr. 4, Oktober 2000 (2000-10), Seiten 844-857, XP002167651 ISSN: 0736-6205 * das ganze Dokument *	1-15	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abchlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	17. Mai 2001	Hagenmaier, S	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 (03.02.92) (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 9182

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-05-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9011369 A	04-10-1990	AT 147791 T	15-02-1997
		AU 646220 B	17-02-1994
		AU 5272890 A	22-10-1990
		CA 2050681 A	23-09-1990
		DE 69029726 D	27-02-1997
		DE 69029726 T	04-09-1997
		EP 0464067 A	08-01-1992
		JP 4505999 T	22-10-1992
		US 5629158 A	13-05-1997
WO 9828438 A	02-07-1998	AU 7873898 A	17-07-1998
WO 9905321 A	04-02-1999	AU 729134 B	25-01-2001
		AU 8503298 A	16-02-1999
		CN 1265156 T	30-08-2000
		EP 1000175 A	17-05-2000
		HU 0002356 A	28-11-2000
WO 9631622 A	10-10-1996	EP 0820524 A	28-01-1998
		JP 11503019 T	23-03-1999
		US 6150095 A	21-11-2000
WO 9626291 A	29-08-1996	KEINE	
WO 9604404 A	15-02-1996	US 5641658 A	24-06-1997
		CA 2196604 A	15-02-1996
		EP 0784701 A	23-07-1997
		JP 10505492 T	02-06-1998
		US 6090592 A	18-07-2000
		US 6060288 A	09-05-2000
WO 9321339 A	28-10-1993	AU 3900893 A	18-11-1993
		EP 0635066 A	25-01-1995
		JP 7505533 T	22-06-1995
WO 9309250 A	13-05-1993	AU 667846 B	18-04-1996
		BR 9206705 A	21-11-1995
		CA 2122450 A	13-05-1993
		EP 0672173 A	20-09-1995
		US 6017738 A	25-01-2000
WO 9732040 A	04-09-1997	AU 1889797 A	16-09-1997

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82